1648 *
Limonium sventenii
Siempreviva, siempreviva de Amagro

Jerarquía taxonómica
SPERMATOPHYTA (MAGNOLIOPHYTINA)
MAGNOLIOPSIDA
PLUMBAGINALES
PLUMBAGINACEAE

Distribución del taxón

Azores: FLO COR FAI PIC SJO GRA TER SMI SMA
Madeira: MAD PSA DES
Salvajes: SAG SAP IDF
Canarias: HIE PAL GOM TEN GRC FUE LAN

Tipología y caracterización del hábitat
Generalmente pie de riscos y andenes, situados entre los 300 y 800 m de altitud en el sector noroccidental de Gran Canaria. Participa en varias comunidades vegetales, entre las que se encuentran los tabaibales dulces (Euphorbietum balsamiferae), comunidades de sustitución y comunidades rupícolas (Prenantho pendulae-Taeckholmietum pinnatae). Unos 4.800 individuos se distribuyen de forma desigual en tres localidades, entre las que destaca la montaña de Amagro por contener la mayor parte de los especímenes.

Se encuentra presente en:
ES7010011 ES7010039

Hábitos destacados de la especie
Brotan las inflorescencias entre marzo y agosto, madurando los frutos desde mayo a agosto. Como en otras especies de siempreviva, la polinización cruzada cuenta con la colaboración de los insectos (entomogamia). La dispersión de los frutos se favorece por el viento (anemocoria).

Observaciones
La localidad de Amagro presenta individuos de todas las edades, lo que unido a su elevado número parece indicar un buen estado de conservación.

1562 *
Lotus azoricus

Jerarquía taxonómica
SPERMATOPHYTA (MAGNOLIOPHYTINA)
MAGNOLIOPSIDA
FABALES
FABACEAE

Distribución del taxón

Azores: FLO COR FAI PIC SJO GRA TER SMI SMA
Madeira: MAD PSA DES
Salvajes: SAG SAP IDF
Canarias: HIE PAL GOM TEN GRC FUE LAN

Tipología y caracterización del hábitat
Los individuos se distribuyen sobre coladas o depósitos de ladera de áreas costeras soleadas, sobre sustratos terrosos o fisurícolas, en un rango comprendido entre los 5 y los 50 m de altitud y participando como especie característica de Polygonetum maritimi. Numerosas localidades que aglutinan de 4.000 a 5.000 ejemplares.

Hábitos destacados de la especie
En todas las ubicaciones manifiesta un marcado carácter fotófilo. Con respecto al sustrato, en unas localidades actúa como saxícola (aprovechando las grietas de los sustratos rocosos) y en otras desarrollándose sobre suelos terrosos.

Observaciones
El área de distribución está muy restringida. No ha sido citado en las fichas del formulario normalizado de datos disponible en la web de la Comisión Europea.
El área de distribución presenta un frecuente uso humano, que favorece una degradación del medio.

El Hierro