

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Nome Comum: Garça Branca Pequena

A Garça-Branca-Pequena pertence à ordem dos Ciconiformes, família Ardeidae.

Esta espécie, embora de ocorrência frequente nos Açores, não é residente, contudo a sua presença nos ecossistemas açorianos é importante.

Os Açores pela sua localização geográfica central no Atlântico ficam fora das grandes rotas de migração das aves, representando um papel pouco importante na sua conservação. Contudo, devido às correntes atmosféricas e à posição marginal em relação às rotas de migração, muitos indivíduos de várias espécies são arrastados até esta região, desviando-se da sua rota normal (Monteiro & Pedro, 1995). Em consequência disto, para além da avifauna residente, regista-se a ocorrência de inúmeras aves visitantes, evidenciando-se o grupo das aquáticas migradoras, ao qual a *Egretta garzetta* pertence. A sua ocorrência encontra-se registada nas primeiras listas de espécies de aves para os Açores.

A ausência de espécies residentes nas zonas húmidas açorianas faz com que muitas funções ecológicas dependam da interacção com as aves aquáticas visitantes. Deste modo estas funcionam como espécies indicadoras da integridade dos *habitat* de zonas húmidas e desempenham um importante papel ao nível do equilíbrio destes sistemas.

Estas espécies visitantes e ocasionais permitem o estabelecimento de uma ligação entre as comunidades húmidas do Norte Europa, de onde migram, aos Açores e consequentemente, contribuem para a biodiversidade e maturidade das nossas zonas húmidas.

Distribuição

Ocorre em todas as ilhas como espécie Invernante regular e ocasional de Verão, mas não nidifica em nenhuma ilha e é pouco abundante.

Protecção e Status

A *Egretta garzetta* encontra-se protegida pela Directiva Aves/Habitats Decreto-Lei n.º 140/99, incluída no Anexo A-I sujeita a medidas que visam a sua protecção e do seu *habitat*, bem como pelo Anexo II da Convenção de Berna Decreto-Lei n.º 316/89.

Nos Açores a espécie é pouco abundante, não sendo relevante o estado das suas populações para a conservação da espécie.

Ecologia e Habitat

A ecologia da espécie nos Açores é totalmente desconhecida. Esta como a maioria das espécies aquáticas que ocorrem nos Açores, têm sido mencionadas pelos ornitólogos apenas como meras curiosidades e o papel que estas desempenham nos ecossistemas açorianos e a utilização que fazem dos *habitats* nunca foi devidamente estudado.

Nos Açores a *Egretta garzetta* ocorre isoladamente ou por vezes em pequenos bandos, associada em particular à orla costeira e zonas húmidas costeiras, por vezes é observada nas zonas húmidas do interior da ilha, principalmente nas lagoas.

Ameaças

A degradação acentuada das zonas húmidas e a perda de qualidade e adequação destes *habitat* para as aves, surge como o principal problema para a quebra do fluxo de aves visitantes, incluindo a *Egretta Garzetta*. Por este motivo torna-se importante o estudo destes *habitats* e das espécies associadas a estes, de forma a garantir a sua salvaguarda e impedir distúrbios que possam pôr em causa a sua capacidade de sustentação. A diminuição do fluxo de aves aquáticas a médio longo prazo pode implicar o surgimento de graves problemas de gestão.

Outra ameaça directa à espécie é a caça. Estas espécies, pela sua raridade no arquipélago, são muitas vezes perseguidas e caçadas para o comércio de aves embalsamadas.

Informação Ecológica

Tabela 3: Avaliação do estado de Conservação/Populacional de Egretta garzetta.

Ilha	SIC	Espécie	População	Conservação
Faial	Caldeira e Capelinhos - SIC	Egretta garzetta	D	.
Faial	Caldeira e Capelinhos - ZPE	Egretta garzetta	D	.
Faial	Ponta do Varadouro - SIC	Egretta garzetta	D	.
Faial	Morro do Castelo Branco - SIC	Egretta garzetta	D	.
Flores	Zona Central - Morro Alto - SIC	Egretta garzetta	D	.
Graciosa	Ponta Branca - SIC	Egretta garzetta	D	.
Pico	Montanha do Pico, Mistério da Prainha e Caveiro - SIC	Egretta garzetta	D	.
Pico	Montanha do Pico, Mistério da Prainha e Caveiro -ZPE	Egretta garzetta	D	.
Pico	Ponta da Ilha - SIC	Egretta garzetta	D	.
Pico	Ponta da Ilha - ZPE	Egretta garzetta	D	.
Santa Maria	Ponta do Castelo - SIC	Egretta garzetta	D	.
São Jorge	Costa Nordeste e Ponta do Topo - SIC	Egretta garzetta	D	.
São Jorge	Ponta dos Rosais - SIC	Egretta garzetta	D	.
São Miguel	Lagoa do Fogo - SIC	Egretta garzetta	D	.
São Miguel	Pico da Vara - Ribeira do Guilherme - ZPE	Egretta garzetta	D	.
Terceira	Serra de Santa Bárbara e Pico Alto - SIC	Egretta garzetta	D	.
Terceira	Costa das Quatro Ribeiras - SIC	Egretta garzetta	D	.

Observação: estas classificações são realizadas de acordo com as regras estabelecidas pela Comissão Europeia DG XI.D.2

* População: tamanho e densidade da população da espécie presente no sítio em relação à população do território nacional.

A: $100\% \geq p > 15\%$

B: $15\% \geq p > 2\%$

C: $2\% \geq p > 0\%$

D: População não significativa

* Conservação: grau de conservação das características do habitat que são importantes para a espécie em causa e com possibilidades de recuperação.

A: Excelente conservação

B: Boa conservação

C: Conservação média ou reduzida