


2



**Datos sobre la distribución de los  
*Muscini* y *Stomoxyni* españoles  
 (Diptera: Muscidae)**

**D. González Mora**

**RESUMEN**

Desde la Última revisión de los *Stomoxyni* y *Muscini* españoles, se han obtenido nuevos materiales. Se da una relación de los mismos y se aportan algunos datos sobre su distribución.

**Palabras clave:** *Muscini*, *Stomoxyni*, distribución geográfica, España.

**SUMMARY**

**Data about the distribution of the Spanish *Muscini* and *Stomoxyni* (Diptera: Muscidae).**

Since the last revision of the Spanish *Muscini* and *Stomoxyni*, new specimens have been captured. In this paper, these data of distribution are given.

**Key words:** *Muscini*, *Stomoxyni*, geographical distribution Spain.

Estos dos grupos fueron revisados en España por PERIS (1951), PERIS y LLORENTE (1963) y por BAEZ (1982) en las Islas Canarias. PORTILLO (1978), estudió la distribución geográfica en la provincia de Salamanca.

Del estudio de nuevos materiales se han obtenido los datos que aquí se relacionan y que vienen a incrementar, con nuevas citas, nuestro conocimiento sobre estos grupos.

En la composición de los *Stomoxyni* se sigue a MALLOCH (1932), y en cuanto a la nomenclatura es la adoptada por PONT (1986) en su catálogo de las especies paleárticas.

#### MATERIAL ESTUDIADO

##### ***Polietes meridionalis* Peris y Llorente, 1963**

Salamanca: Salamanca, 1♀, 24-IV-1983 (R. Andrés).

Mencionada anteriormente de las provincias de Madrid, Pontevedra y de otras localidades de la provincia de Salamanca.

##### ***Musca domestica calleva* Walker, 1849**

Murcia: Muela, 1♀ (D. Blaya Navarro). Pontevedra: Moscoso, 1♀, 25-IX-1969 (R. Oute-relo). Valencia: Chiva, 1♂, 12-VIII-1964 (S. V. Peris).

Ya citada de las Islas Canarias (Lanzarote, La Palma, Tenerife), Zaragoza y otras localidades de la provincia de Valencia.

##### ***Musca domestica domestica* Linnaeus, 1758**

Almena: La Hoya, 1♀, 6-VI-1963 (S. V. Pens). Castellón de la Plana: Columbrete Grande (I. Columbretes), 1♂, 23-V-1964 (S. V. Peris). Huelva: Mazagón, Id, 10-VI-1963 (S. V. Peris).

Es frecuente en toda España. Se cita por primera vez de las provincias de Almería y Castellón.

##### ***Musca osiris* Wiedemann, 1826**

Avila: Parador de Credos, 1♀, 25-X-1965 (V. Llorente). Castellón de la Plana: Columbrete Grande (I. Columbretes), 8♀♀, 20-V-1964 (S. V. Peris), 3♂♂, 5♀♀, 22-V-1964 (S. V. Peris). Madrid: Galapagar, 1♂, 1♀, 4-VI-1965 (S. V. Peris).

Es una especie presente prácticamente en toda España, aunque no se conocía de las localidades mencionadas.

##### ***Musca autumnalis* De Geer, 1776**

Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, 1♂, 10-IX-1962 (V. Llorente). Madrid: Meco, 1♀, 3-VII-1960 (S. V. Peris), 1♂, 15-VII-1962 (A. Compte); Barranca de Navacerrada, Id, 2♀♀, 9-IX-1978 (D. Glez.-Mora). Segovia: Cotos, 1♀, 25-VIII-1965 (S. V. Peris). Valencia: Chiva, 1♂, 12-VIII-1964 (S. V. Peris); Paterna, 1♂, 4-VIII-1964 (S. V. Peris).

Ampliamente repartida por la Península Ibérica, se cita por primera vez para las provincias de Cádiz y Valencia, y para las localidades mencionadas de las provincias de Madrid y Segovia.

**Morellia aenescens** Robineau-Desvoidy, 1830

Huesca: Candanchú, 1400 m., 1♀, VIII-1943 (J. M. Dusmet).

La única cita ibérica conocida de esta especie es de otra localidad de la provincia de Huesca.

**Morellia hortorum** (Fallen, 1816)

Huesca: Candanchú, 1400 m., 1♀, VIII-1943 (J. M. Dusmet). Pontevedra: Villagarcía de Arosa, 1♀, VIII-1963 (J. L. Saavedra).

Citada anteriormente de las provincias de Gerona, Huesca y Madrid.

**Morellia simplex** (Loew, 1857)

Madrid: Navacerrada: 1♂, 13-IX-1963 (S. V. Peris). Pontevedra: Villagarcía de Arosa, 1♀, VIII-1963 (J. L. Saavedra).

Ya conocida de otras localidades de las provincias de Madrid, Segovia, Zaragoza, Navarra, Vizcaya y Granada.

**Eudasyphora cyanella** (Meigen, 1826)

Madrid: La Jarosa, 1♀, 7-VI-1976 (V. Monserrat); Madrid, Id., 13-IV-1977 (M. German); Los Negrals, 1♂, V-1977 (C. Garrote). Pontevedra: Villagarcía de Arosa, 1♂, VIII-1962 (J. L. Saavedra). Moscoso, 1♀, 4-VIII-1970 (R. Outerelo).

Citada anteriormente de las provincias de Logroño, Segovia, Madrid, Córdoba, Cádiz y Salamanca.

**Dasyphora albofasciata** (Macquart, 1838).

Pontevedra: Villagarcía de Arosa, 2♂♂, VIII-1962 (J. L. Saavedra).

Ya citada de centro y sur de la Península e Islas Canarias.

**Pyrellia vivida** Robineau-Desvoidy, 1830

Asturias: Vega de Ribadesella, 1♂, IX-1978 (D. Glez.-Mora).

Es frecuente en la Península y Baleares. Se cita por primera vez en Asturias.

**Neomyia cornicina** (Fabricius, 1781).

Asturias: Vega de Ribadesella, 9♂♂, 8♀♀, IX-1978 (D. Glez.-Mora). Guadalajara: San-  
ta Cruz, 6♀♀, 5-VI-1976 (A. Soler). Madrid: Guadarrama, 1♂, 25-V-1977 (A. Ruiz); Ba-  
rranca de Navacerrada, 3♀♀, 9-IX-1978 (D. Glez.-Mora). Segovia: Peñalara, 1♂, 29-VIII-1965  
(S. V. Peris).

repartida por la Península y Canarias.

**Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758)**

Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, 1♀, 8-IX-1962 (V. Llorente). Castellón de la Plana: Columbrete Grande (I. Columbretes), 2♀♀, 22-V-1964 (S. V. Peris). Granada: Dúrcal, 1♂, VII-1945 (S. V. Peris). Pontevedra: Villagarcía de Arosa, 1♀, VIII-1962 (J. L. Saavedra). Valencia: Rocafort, 1♀, 8-VIII-1958 (S. V. Peris), 1♀, 2-VII-1960 (S. V. Peris), 20-VIII-1963 (S. V. Peris). Zamora: Puebla de Sanabria, 1♀, VIII-1953, Lago de Sanabria, 4♀♀, 22-30-VII-1953 (E. Ortiz). Baleares: Mallorca, Esporlas, 1♀, 19-X-1962 (A. Compte). Menorca: Mahon, 1♀, 23-24-X-1962 (A. Compte). Canarias: Gran Canaria, La Guardia, 1♀, VIII-1961 (A. Bello); Los Tilos, 1♂, 5-V-1934; Tirajana, 2♂♂, 29-V-1934 (coll. Cabrera). Tenerife, La Laguna, 1♂, 8-IX-1910, con la etiqueta « Q de las que pican », 1♀, 15-XI-1931, 1♀, 6-VI-1936.

Se encuentra repartida por toda España, aunque aún no había sido citada de las localidades que se indican.

**Haematobosca atripalpis (Bezzi, 1895)**

Madrid: Villanueva del Pardillo, 1♂, 27-IV-1932 (J. Dusmet). Huesca: Hecho, 1♀, 28-VIII-1932 (J. Dusmet). Valladolid: Tordesillas, 1♂, 21-VI-1930 (J. Dusmet).

Citada anteriormente de lugares secos y áridos del interior de la Península.

**Haematobia irritans (Linnaeus, 1758)**

Canarias: Tenerife, Agua García, 1♂, VIII-1927 (Cabrera); Tenerife, 1♂. Mencionada de la Península Ibérica.

## AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Don Salvador V. Peris que me ha proporcionado el material para este trabajo.

## BIBLIOGRAFÍA

- BAEZ, M. 1982. Dípteros de Canarias VII: *Muscinae (Dipt., Muscidae)*. *Vieraea*. 11 (1-2): 171-192.
- MALLOCH, J. R. 1932. Exotic Muscaridae. *XXXVI. Ann. Mag. Nat. Hist.* (10), 9, 377-518.
- PERIS, S. V. 1951. Los Stomoxydinae de la Península Ibérica. *Rev. Acad. Ciencias Zaragoza* (Ser. 2a) 6: 41-49.
- PERIS, S. V. y LLORENTE, V. 1963. Notas sobre los Muscini paleárticos y revisión de las especies españolas. *Bol. R. Soc. Españ. Hist. nat.* 61: 209-269.
- PONT, A. C. 1986. *Family Muscidae*. En Soos, A. y PAPP, L. (Eds.): Catalogue of the Palearctic Diptera. XI: 57-215. Elsevier.
- PORTILLO, M. 1978. Contribución al conocimiento de los Dípteros coprófagos en heces de vacuno de la provincia de Salamanca, II: *Muscidae*. *Boll. Asoc. esp. Entom.* 1: 119-122.

Fecha de recepción: 12 de febrero de 1988  
Fecha de aceptación: 20 de febrero de 1989

Dolores González Mora  
Catedra de Entomología  
Facultad de Biología  
Universidad Complutense  
28040 Madrid