

AVES PASERIFORMES DE CANARIAS

Francisco Pérez Padrón

Contamos en estas bellas islas, con una buena representación de aves, de ellas treinta y cinco son "paseriformes" y las otras treinta y siete pertenecen a diversos ordenes. De este conjunto, - son endémicas diez especies y otras muchas son subespecies de las formas europeas.

El orden de las PASERIFORMES, está integrado en Canarias por diez familias:

CORVIDOS.- Con dos especies: el cuervo Corvus corax tingitanus Irby 65 cm. Totalmente negro con reflejos metálicos; habita en todas las islas en barrancos, montes, terrenos áridos etc; anida en árboles altos y peñascos.

La chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Gm.). Conocida vulgarmente por graja. 39 cm. Negra, con pico y patas rojos; se encuentra solamente en la Isla de La Palma, en terrenos cultivados, acantilados, barrancos; anida en rocas hendidas, agujeros de acantilados etc.

MOTACILIDOS.- En esta familia y dentro del género Motacilla tenemos a la lavandera cascadeña Motacilla cinerea cinerea (Hart.) Conocida vulgarmente por "alpispa". 18 cm. Pecho amarillo, larga cola negra en continuo movimiento, partes superiores gris azuladas, obispillo amarillo verdoso. El macho, en periodo de celo, presenta, la garganta negra; vive en tierras cultivadas, barrancos, lugares encharcados y pantanosos; anida en grietas de rocas, agujeros de las paredes.

El otro representante de esta familia, pertenece al género Anthus y se trata del bisbita caminero

Anthus bertheloti Bolle . Conocido por " caminero" y "chilin". De 14 a 15 cm. Partes superiores castañas con motas oscuras; el pecho está manchado de negro, los flancos algo menos y el vientre blanquuzco. Las plumas externas de las timoneras son blancas; vive en terrenos áridos con matorral, zonas cultivadas; anida en el suelo. Muy extendido - por las islas.



Pareja de Pájaro moro Bucanetes githagineus amantum Hart.

ALAUDIDOS.- Esta familia la integran en estas islas, dos subespecies de la terrera marismeña Calandrella rufescens (Vieill.). De color pardo grisáceo, con el pecho finamente listado y vientre blanquecino. Criando solo en Tenerife la Calandrella rufescens rufescens (Vieill.). Conocida vulgarmente por "calandria". Vive en terrenos abiertos, zonas cultivadas; anida en el suelo.

Criado en varias islas, la Calandrella rufescens polatzeki Hart. Ambas subespecies tienen unos 14 cm. de longitud.

PLOCEIDOS.- Gorrión moruno Passer hispaniolensis (Tem.). Conocido vulgarmente en algunas localidades tinerfeñas por "pájaro pollo" y en Gran Canaria por "palmero". De 14'5 a 15 cm. El macho tiene la garganta y pecho negro y mas extendido que en otros gorriónes, flancos listados de negro con parte superior de la cabeza y cuello castaño rojizo; habita en las proximidades de edificios de las ciudades, árboles de carreteras, casas de campo; anida en aleros de tejados, huecos de las paredes y eucaliptos. Actualmente está extendido en casi todas las islas; encontrándose en un principio en las islas orientales y en Tenerife lleva apenas un siglo de existencia.

Gorrión Chillón Petronia petronia madeirensis Erlang. Conocido vulgarmente por "pión de valle" y "pájaro ermita". De 14 a 15 cm. Distínguese de la hembra de gorrión moruno por una mancha amarilla en la garganta, así como por motas blancas en los extremos de las rectrices; habita en riscos, valles, ruinas, graneros etc; anida en tejados, muros, agujeros de paredes.

FRINGILIDOS.- Esta familia está representada por especies muy interesantes, algunas endémicas de nuestras islas.

El género Fringilla lo integran el pinzón azul de Tenerife Fringilla teydea teydea Webb. Conocido vulgarmente por "pájaro azul del Teide" y "pájaro de la cumbre". De 17'5 a 18 cm. El macho es bellissimo con partes superiores azul-plomizo, estrecha faja frontal negra; alas negras con estrechos margenes blanco azulado y cola negra; la garganta y pecho son azulado con parte baja del pecho y vientre blancuzco. Vive en los montes de pinar que circundan al Teide; se encuentra en los alrededores del

Portillo de las Cañadas, Vilaflor, bajando del Portillo a Aguamasa y La Esperanza hasta Las Lagunetas; anida en pinos, más raramente en brezos y es probable que lo haga en lo más espeso de la retama (sin confirmar por mí).

En Gran Canaria, habita el pinzón de Gran Canaria Fringilla teydea polatzeki Hart. Se encuentra en los montes de pinar de Tamadaba, Pajonales y Tirajana.

Otros representantes del género Fringilla son: el pinzón vulgar de Tenerife Fringilla coelebs tintillón Webb. Conocido vulgarmente por: "chau-chau", "cochinero", "pájaro tortolo", "pájaro de monte". De 16 a 17 cm. anida en pinos, laureles silvestres, castaños etc. El macho adulto presenta occipucio negro azulado, frente de color antracita, dorso gris azulado, obispillo y rabadilla verde-amarillento; las coberteras superiores de la cola son gris pizarra. La garganta y cara son pardo leonadas tirando a rosado en la parte baja del pecho y flancos; mitad del vientre blanco; remeras negruzcas con margenes amarillo oliváceos; coberteras negras punteadas de blanco y las coberteras medianas forman una barra blanca sobre las alas, cola negra con rectrices externas blancas. Se encuentra en los montes de las Mercedes, Esperanza, Aguamansa, Aguagarcía, Garachico etc.

En la Isla del Hierro vive Fringilla coelebs ombriosus Hart. Conocido por "chao-chao". Semejante al tintillón, pero tiene algo de verde no sólo en la rabadilla sino en el dorso; partes inferiores más pálidas y el vientre blanquecino; localizado en el monte del crater junto al Golfo.

En La Palma vive el Fringilla coelebs palmae Trist. Se distingue del tintillón por tener la rabadilla azul-pizarra tirando a negro.


El género Carduelis está representado por dos especies:

Jilguero Carduelis carduelis (Linn.). Conocido vulgarmente por "pájaro pinto". De 12'5 a 13 cm. Hace unos años muy común en las islas, pero actualmente existen contados ejemplares. Ambos sexos iguales en coloración; cara de color carmín, cabeza blanca y negra; dorso pardo leonado y obispillo blanco, alas negras con marcada banda amarilla; habita en zonas cultivadas y terrenos baldíos con cardos, en Tenerife se encuentra en Las Mercedes, Tejina, Valleguerra, Tacoronte, etc.; anida en la parte mas alta de una conífera, castaño, eucalipto.

Verderón común Carduelis chloris (Linn.). De 14 a 15 cm. De muy reciente introducción en Canarias, pues no se cita en ninguna obra como especie sedentaria. El macho es de color verde oliváceo en las partes superiores, amarillo en las inferiores, con obispillo amarillo verdoso y color amarillo en las alas y cola. En Tenerife se encuentra en El Sauzal donde cría; así como en Tacoronte y Los Rodeos; anida en setos, arbustos y coníferas.

El género Acanthis presenta al pardillo común Acanthis cannabina (Linn.) del que se citan dos subespecies en Canarias; una el Acanthis cannabina harterti (Bann.), en Lanzarote y Acanthis cannabina meadowaldoi Hart., en Tenerife. Longitud de estas subespecies: 13 cm. Conocida vulgarmente en Tenerife por "millero" y por "linacero" en Gran Canaria; el macho en celo presenta manto de color pardo castaño, remeras y timoneras pardo oscuras con bordes blancos; cabeza gris ceniza, frente y pecho rojo carmín y garganta blanquecina con listas pardas. Vive en linderos de montes, zonas cultivadas, terrenos áridos y con cardos anida en brezos, tagasastes (Cytisus proliferus), perales y otros árboles frutales. Extendido por todas las islas.

El género Bucanetes representado por el camachuelo trompetero o pájaro moro Bucanetes githagi-neus amantum Hart. Conocido vulgarmente por "pájaro piano". 13 cm. El macho es de color pardo grisáceo, con matices rosados en cara, partes inferiores, alas y obispillo; pico rojo coral; habita en lugares secos y pedregosos; en Tenerife se puede ver por el sur de la Isla, Poris de Abona, Los Cristianos, Las Galletas. En Lanzarote y Fuerteventura es muy numeroso; en Gran Canaria le he visto en Galdar, y zonas desiertas del oeste de la Isla; anida en el suelo y entre las peñas.



La elegante Lavandera cascadeña Motacilla cinerea cinerea (Hart.) gusta de los parajes húmedos.

El género Serinus está representado por ese excelente cantor que es el canario Serinus canarius canarius (Linn.). 12'5 cm. El macho es de color amarillo verdoso en la frente, región superciliar, garganta, pecho y rabadilla; bajo vientre e infracobertoras caudales de color blanco; dorso gris verdoso salpicado de negro; remeras grises y coberteras verde-amarillentas y timoneras grises orilladas de ama-

rillo verdoso. La hembra es de colores mas apagados.

Habita en campos, cultivos, barrandos donde abundan las higueras, montes de coníferas y laurisilva; anida en pinos, laureles silvestres, tagasastés, brezos, etc.; se encuentra solo en las islas mas occidentales (Gran Canaria, Tenerife, Palma, Gomera y Hierro).

EMBERICIDOS.- Esta familia está representada por una especie que hasta hace muy poco integraba la familia Fringillidae, el triguero Emberiza calandra Linn. 18 cm. De color pardo, listado en dorso y pecho; vive en campos de trigo y zonas cultivadas; anida en el suelo, entre el trigo, dentro de algún cardo. Corriente en las islas y suele verse en campos de trigo, donde desarrolla sus actividades gastronómicas.

PARIDOS.- Representada en las islas por cuatro subespecies del Herrillo común Parus caeruleus Linn. En las islas de Tenerife, Gran Canaria y Gomera vive el herrerillo c. tinerfeño Parus caeruleus teneriffae Less. Conocido vulgarmente por "chirrero", "ratonero", "chiviri-chiviri", "encabestrado", "corbatita" y frailero". De color azul en pileo, dorso, alas y cola; partes inferiores amarillas; mejillas blancas con lista negra a través del ojo, alrededor de la nuca y mejillas hasta el mentón pileo bordeado de blanco. Habita en montes, setos, jardines; distribuido por casi toda la superficie de estas islas; anida en agujeros de árboles y paredes.

En Lanzarote y Fuerteventura vive el herrerillo de Fuerteventura Parus caeruleus degener Hart. Se distingue del tinerfeño, en que tiene el dorso gris-pizarra, con las coberteras alares y secundarias manchadas de blanco. Centro del vientre blancuzco mostrando una clara raya negra.

En la Isla de La Palma se encuentra el herrerillo de La Palma Parus caeruleus palmensis Meade-Waldo. Presenta el dorso gris azulado, sin brillo, pecho amarillo y vientre blanco; grandes coberteras con estrechos márgenes blancos.

En la Isla del Hierro habita el herrerillo herreño Parus caeruleus ombriosus Meade-Valdo. Verde oliváceo en el dorso; pecho y vientre amarillo como el de Tenerife, pero mas oscuro. Coberteras alares bordeadas de blanco grisáceo.

Estas subespecies miden de 11 a 12 cm.

LANIDOS.- Representados por el alcaudón real noruno Lanius excubitor koenigi Hart. Conocido vulgarmente por "alcairon". 24 cm. De color blanco, negro y gris con pico grande, con la rama superior encorvada y denticulada; habita en lugares áridos, inmediaciones de montes, pequeños montes de pinos y retamas; anida en la maleza; en Tenerife se ve frecuentemente en Las Cañadas, Portillo, sur de la isla.

TURDIDOS.- Esta familia la integran el mirlo Turdus merula cabreræ Hart. 27 cm. El macho es de color negro con pico y círculo perioftálmico de color amarillo anaranjado. Habita en montes, setos, jardines, parques, fincas, cultivos de platanera; anida en zarzas, arbustos, cedros, araucarias, piñas de platanos. Se encuentra en todos los montes verdes y húmedos de las islas occidentales; en Tenerife es común en los montes de: Las Mercedes, La Esperanza Aguamansa, Garachico y otras zonas cultivadas de la isla.

El petirrojo Erithacus rubecula (Linn.) 14 cm. Este bello Túrvido está representado en las islas por dos subespecies; en las tres islas mas occidentales, Palma, Gomera y Hierro, vive una de

estas dos subespecies, conocida científicamente por Erithacus rubecula microrhynchus Reich., muy parecida a la especie europea Erithacus rubecula (Linn.) En Tenerife y Gran Canaria se encuentra la otra subespecie el Erithacus rubecula superbus Koen. Conocida vulgarmente por "papito", "pájaro de San Antonio" y "pechuguita". Los machos tienen en la frente y el pecho de color rojo anaranjado y las partes superiores pardo oliváceas. Vive en los montes de laurisilva, coníferas y en fincas; anida en huecos de árboles, brezos, pinos etc.

La Tarabilla canaria Saxicola dacotiae dacotiae Maade-Waldo. De 12'5 a 13 cm. De color castaño en la frente, occipucio y nuca con lista superciliar blanca que va desde la base del pico hasta detrás del ojo; una banda blanca en alas, Pecho castaño pálido, vientre blanco, dorso castaño grisáceo y rabadilla blanca. Vive en barrancos y terrenos áridos en donde abunde la vegetación, también zonas arenosas y playas; vive solamente en Fuerteventura: vista en las localidades de Gran Tarajal, Tuineje etc. anida en arbustos y en alguna planta de notable tamaño.

Se ha citado también en Canarias la Saxicola dacotiae murielae Bann. Propia del islote de Alegranza.

REGULIDOS.- Familia integrada por el rey zuelo sencillo tinerfeño Regulus regulus teneriffae Sebb. Conocido vulgarmente por "banderita". 9'5 cm. Pileo amarillo bordeado de negro; los machos presentan en el centro de la cabeza una cresta de color anaranjado; partes superiores verdes oliváceas; partes inferiores blanco sucias; las alas tienen una ancha faja negra y dos franjas blancas. Habita en montes de coníferas, arbustos y matorra

les; anida en brezos y extremos de ramas de coñíferas.

SILVIDOS.- Representada esta familia por tres especies que integran el género Sylvia, y una el Phylloscopus.

Al primer género pertenecen la curruca capirotada Sylvia atricapilla atricapilla (Linn.) Conocida vulgarmente por "capirote". 14 cm. Presenta el macho píleo negro hasta la parte superior de los ojos: dorso pardo grisáceo; lados de la cabeza y partes inferiores, gris ceniza. La hembra tiene píleo pardo rojizo. Habita en huertos, zonas cultivadas; muy común en Gran Canaria, Tenerife, Palma, Gomera y Hierro anida en zarzas, rosales, cedros, ciruelos, perales y toda clase de arbustos.

La curruca tomillera Sylvia conspicillata orbitalis (Wah.). Conocida por "zarzalero" 13 cm. Alas castaño rojizas, garganta blanca, píleo pizarroso y pecho pardo rosado. Tiene un estrecho anillo ocular blanco. Habita en jardines, zarzas matorrales y lugares áridos con matojos; anida en zarzas y matorrales. Todas las islas excepto Hierro.

La curruca cabecinegra Sylvia melanocephala leucogastra (Led.) 13cm. El macho posee capirote negro hasta muy por debajo del ojo, garganta blanca, partes superiores grises, inferiores blancuzcas con flancos cenicientos; anillo ocular rojizo; la cola escalonada, negra, con rectrices externas blancas. Habita en montes con maleza y matorral, espesura y arbusto. En Tenerife se encuentra en los montes de: Las Mercedes Esperanza y otros.

Al género Phylloscopus pertenece el mosquitero común de Canarias Phylloscopus collybita ca-

nariensis Hart. Conocido vulgarmente por "hornero" y "chivita". 11 cm. Presenta partes superiores pardo oliváceas y partes inferiores blanco sucias con un matiz amarillo limón. Vive en huertos, montes y zonas cultivadas; anida en brezos, cedros, zarzas y matorrales. Se encuentra en todas las islas y es muy común en todos los montes.

Resumen

Estudio sobre las aves passeriformes en Canarias, preferentemente las de la isla de Tenerife. Notas sobre su habitat.

Summary

An enumeration of passeriform birds from the Canary Islands, principally from the island of Tenerife are done. Also some notes concerning the habitat.

Bibliografía

- 1º D.A. BANNERMAN.- "Birds of the Atlantic Islands". 1963.
- 2º F. BERNIS.- "Prontuario de la avifauna española". ARDEOLA 1955.
- 3º R.D. ETCHECOPAR and FRANÇOIS HÜE. "The birds of North Africa".
- 4º R.T. PETERSON, GUY MOUNTFORT Y P.A.D. HOLLÖM.- "Guía de campo de las aves de España y demás países de Europa". Ediciones Omega, S.A.- Barcelona. 1967.